

RUTA DE ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN

Valoración del menor de 5 años en el programa consulta externa o urgencias.

Desnutrición aguda severa

Desnutrición aguda moderada

Riesgo de Desnutrición

Cuando el puntaje Z del indicador Peso/Talla-L es menor a -3 DE o cuando se presenta edema bilateral de origen nutricional, que puede llegar a anasarca.

Los siguientes términos se utilizan para describir los fenotipos que se pueden dar en desnutrición aguda severa

Kwashiorkor

Marasmo.

Cuando el puntaje Z del indicador Peso/Talla-L, es menor a -2 DE y mayor o igual a -3 DE. Puede acompañarse de algún grado de emaciación o delgadez. Este tipo de desnutrición debe detectarse y tratarse con oportunidad, dado que en pocos tiempos se puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas.

Cuando el puntaje Z del indicador Peso/Talla-L, entre -1 DE y -2 DE.

Niños Menores de 6 meses

Niños de 6 meses a 59 meses.

Prueba de apetito POSITIVA

**MANEJO HOSPITALARIO
CON F -75**

MANEJO AMBULATORIO CON FTLC

Prueba de apetito NEGATIVA

Niños de 6 meses a 59 meses. Con peso menor a 4 kilogramos o perímetro braquial menor a 11.5 cm

MANEJO HOSPITALARIO

